



Humanophthalmika - Glukokortikoide

Dexapos-COMOD® Augentropfen, Lösung, 5 ml

 AUGENTROPFEN

Wirkstoff:

1,0 mg/ml Dexamethason-21-(3-sulfobenzoat), Natriumsalz
Konservierungsmittelfrei.

Anwendungsgebiete

Behandlung von schweren nicht-infektiösen Entzündungen des Auges, wie schwere Allergien der Augen, schwere entzündliche Erkrankungen der Bindehaut, Entzündungen der Hornhaut und des vorderen Augenabschnittes; Reizzustände nach Operationen.

Fluoropos® Augentropfen, Suspension, 5 ml

 AUGENTROPFEN

Wirkstoff:

1,0 mg/ml Fluorometholon
Enthält Benzalkoniumchlorid.

Anwendungsgebiete

Zur lokalen Behandlung von nicht erregerbedingten entzündlichen Erkrankungen des vorderen Augenabschnittes, wie z. B. allergische Konjunktivitis, Keratitis parenchymatosa, akute Iritis, Iridozyklitis, postoperative Reizzustände.

Hydrocortison-POS® N 1% Augensalbe, 2,5 g

 AUGENSALBE

Wirkstoff:

10 mg/g Hydrocortisonacetat
Enthält Wollwachs.

Anwendungsgebiete

Zur Steroidbehandlung von allergischen, nicht infektiösen, entzündlichen Erkrankungen der Bindehaut, der Hornhaut, des vorderen Augenabschnittes und der Augenlider (z. B. Blepharitis).



Hydrocortison-POS® N 2,5% Augensalbe, 2,5 g

 AUGENSALBE

Wirkstoff:

25 mg/g Hydrocortisonacetat

Enthält Wollwachs.

Anwendungsgebiete

Zur Steroidbehandlung von allergischen, nicht infektiösen, entzündlichen Erkrankungen der Bindehaut, der Hornhaut, des vorderen Augenabschnittes und der Augenlider (z. B. Blepharitis).

Predni-POS® 0,5% Augentropfen, Suspension, 10 ml

 AUGENTROPFEN

Wirkstoff:

5,0 mg/ml Prednisolonacetat

Enthält Benzalkoniumchlorid.

Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung schwerer nicht infektiöser, entzündlicher Erkrankungen des Auges, z. B. schwere allergische Konjunktivitis, schwere und mittelschwere Konjunktivitis vernalis, Keratoconjunktivitis scrophulosa, Acne rosacea-Keratitits, Keratitits parenchymatosa, Keratitits disciformis; symptomatischen Behandlung von Uveitits, Iritits, Iridocyclitits; Verminderung postoperativer Erscheinungen, z.B. nach Katarakt-Operationen.

Predni-POS® 1% Augentropfen, Suspension, 10 ml

 AUGENTROPFEN

Wirkstoff:

10,0 mg/ml Prednisolonacetat

Enthält Benzalkoniumchlorid.

Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung von unspezifischen, nichtinfektiösen, entzündlichen Erkrankungen des Auges, d. h. der vorderen Augenabschnitte (z. B. schwere allergische Konjunktivitis, schwere allergische Blepharitis, Episkleritits, Skleritits, Keratitits, Hornhautrandgeschwüre (gleichzeitige Antibiotikagabe erforderlich)), der mittleren Augenabschnitte (z. B. Iritits, Iridocyclitits, Uveitits anterior, Zyklitits) und nach Verätzungen und Verbrennungen und nach stumpfen Augenverletzungen (z. B. Augapfelprellungen). Weiterhin zur Verminderung postoperativer und posttraumatischer entzündlicher Erscheinungen (z. B. nach Keratoplastik, Katarakt-, Glaukom- und Schieloperationen); prä- und postoperativ zur Vermeidung von Reizzuständen durch Laserbehandlung; sympathische Ophthalmie.