



Lanitop[®] 0,1 mg

Herzwirksames Glykosid (Digitalispräparat) zur oralen Anwendung; Humanpräparat

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Wirkstoff:

0,1 mg Metildigoxin

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 100 Tabletten.

Anwendungsgebiete

Manifeste chronische Herzinsuffizienz (aufgrund systolischer Dysfunktion); Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern / Vorhofflattern; Paroxysmales Vorhofflimmern/Vorhofflattern

Gegenanzeigen

Lanitop[®] 0,1 mg darf nicht angewendet werden bei: Überempfindlichkeit gegenüber Metildigoxin, anderen herzwirksamen Glykosiden oder einem der sonstigen Bestandteile; Verdacht auf Digitalisintoxikation; Kammertachykardie oder Kammerflimmern; AV-Block II. oder III. Grades, pathologischer Sinusknotenfunktion (ausgenommen bei Schrittmacher-Therapie); akzessorischen atrioventrikulären Leitungsbahnen (z. B. WPW-Syndrom) oder Verdacht auf solche; Hypokaliämie; Hyperkalzämie, Hypomagnesiämie; hypertropher Kardiomyopathie mit Obstruktion; thorakalem Aortenaneurysma; gleichzeitiger intravenöser Gabe von Kalziumsalzen.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsinformation.