



Cimetidin acis® 800 mg

Histamin H2-Antagonist zur Hemmung der Magensäuresekretion; Humanpräparat

Zusammensetzung

Jede Tablette enthält:

Wirkstoff:

Cimetidin 800 mg

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 50 Tabletten.

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Erkrankungen im oberen Magen-Darm-Bereich, bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion angezeigt ist: Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi, Rezidivulcera nach Operationen (z. B. Ulcus pepticum jejunii); Zollinger-Ellison-Syndrom.

Hinweise:

Bei geringfügigen Magen-Darm-Beschwerden, z. B. nervösem Magen, ist Cimetidin acis nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Ulcera ventriculi sollte durch geeignete Maßnahmen eine eventuelle Malignität ausgeschlossen werden. Bei Patienten mit Ulcus duodeni oder Ulcus ventriculi sollte der Helicobacter pylori-Status bestimmt werden. Für Helicobacter pylori-positive Patienten ist, wo immer möglich, eine Beseitigung des Bakteriums Helicobacter pylori durch eine Eradikationstherapie anzustreben.

Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren.

Aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes ist **Cimetidin acis® 800 mg** für Kinder und Jugendliche im Wachstumsalter nicht geeignet. Hierfür stehen nach strengster Indikationsstellung Darreichungsformen mit geringerem Wirkstoffgehalt zu Verfügung.

Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsinformation.