



# Dexamethason 0,5 mg GALEN® Tabletten

## Glukokortikoid; Humanpräparat

### Zusammensetzung

Jede Tablette enthält:

Wirkstoff:

Dexamethason 0,5 mg

### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 100 Tabletten

### Anwendungsgebiete

**Neurologie:** Hirnödem (nur bei computertomographisch nachgewiesener Hirndrucksymptomatik), ausgelöst durch Hirntumor, neurochirurgische Eingriffe, Hirnabszess. *Erkrankungen der Lunge und der Atemwege:* Schwere akuter Asthmaanfall.

**Dermatologie:** Orale Anfangsbehandlung ausgedehnter, schwerer, akuter, auf Glucocorticoide ansprechende Hautkrankheiten wie Erythrodermie, Pemphigus vulgaris, akute Ekzeme. **Autoimmunerkrankungen / Rheumatologie:** Orale Anfangsbehandlung von Autoimmunerkrankungen wie systemischer Lupus erythematodes (insbesondere viszerale Formen). Aktive Phasen von Systemvaskulitiden wie Panarteriitis nodosa (bei gleichzeitig bestehender pos. Hepatitis B Serologie sollte die Behandlungsdauer auf zwei Wochen begrenzt werden). Aktive rheumatoide Arthritis mit schwerer progredienter Verlaufsform, z.B. schnell destruierend verlaufende Formen und / oder mit extraartikulären Manifestationen. Juvenile idiopathische Arthritis mit schwerer systemischer Verlaufsform (Still Syndrom) oder mit lokal nicht beeinflussbarer Iridozyklitis. Rheumatisches Fieber mit Karditis. **Infektiologie:** Schwere Infektionskrankheiten mit toxischen Zuständen (z.B. Tuberkulose, Typhus; nur bei gleichzeitiger antiinfektiöser Therapie). Dexamethason 0,5 mg GALEN wird angewendet zur Behandlung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) bei Erwachsenen und Jugendlichen (im Alter von mindestens 12 Jahren und mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg), die eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr erfordert. **Onkologie:** Palliativtherapie maligner Tumoren. Prophylaxe und Therapie von Zytostatika-induziertem Erbrechen im Rahmen antiemetischer Schemata. **Endokrinologie:** Kongenitales adrenogenitales Syndrom im Erwachsenenalter.

### Gegenanzeigen

**Dexamethason 0,5 mg GALEN®** ist kontraindiziert bei Überempfindlichkeit gegen Dexamethason oder einen der sonstigen Bestandteile.

**Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Angaben in der Gebrauchsinformation.**